


درمان فلج موقتی عصب صورت با لیزر

کامل ندارد.

برای درمان به روش‌های قبلی لیزر تراپی را اضافه کردم. در فلج بل درگیری عصب صورت به دلیل ویروس، تومور یا ضربه است و پس از بررسی‌های کامل پزشکی و تشخیص دقیق در بسیاری از موارد می‌توان با لیزرهای پزشکی برای تسریع عملکرد عصب و کاهش درد در ناحیه صورت و کاهش التهاب به بیماران کمک کرد.

در فلج بل معمولاً علائم بعد از چند هفته برطرف می‌شود و در مواردی برخی از علائم طولانی‌مدت ادامه پیدا می‌کند که اکثراً بعد از سه تا شش ماه بهبود می‌یابند. لیزر درمانی بدون درد است و تاکنون عارضه‌ای در درمان با لیزرهای کم توان گزارش نشده و با استفاده از خواص درمانی لیزر، سرعت بهبود عصب صورتی تسریع می‌شود. البته در بیماران مبتلا به فلج بل می‌توان از لیزر طب سوزنی (لیزر اکوپانکچر) هم استفاده کرد که ترکیبی از دانش کهن طب سوزنی و فناوری مدرن لیزر است و هر دو در درمان فلج بل موثر شناخته شده‌اند. لیزر طب سوزنی بدون درد و عارضه و با اثربخشی بالا در رفع دردهای عضلانی اسکلتی، دردهای روان‌تنی، ترمیم زخم و تسریع عملکرد عصبی به کار گرفته می‌شود.



هفته گذشته خانمی ۷۳ ساله به مطب برای ویزیت مراجعه کرد. ایشان از آبان ۹۷ درگیر بیماری خود بود. سؤال کردم مشکل تان چیست؟ با شروع صحبت متوجه انحراف لب در سمت راست صورتش شدم. با صدایی خسته گفت: اوایل آبان، یک دفعه صورتم کج شد و رفتم بیمارستان فکر کردم سگته است، دو روز بستری شدم و پس از آزمایش و اسکن و ام‌آر‌آی و ویزیت متخصص گوش و حلق و بینی، تشخیص فلج

بل دادند و بلافاصله داروی کورتون و آنتی بیوتیک شروع شد به همراه داروها، فیزیوتراپی و گرم کردن موضع و تمرینات حرکات صورت را شروع کردم.

فلج بل (bell's palsy) فلج عصب صورتی است که علائم بیمار به صورت ناگهانی شروع می‌شود و معمولاً عصب به طور موقت فلج شده و یک طرف از صورت درگیر می‌شود. بیماران افتادگی پلک و لب، اشک ریزش و سرازیر شدن آب دهان و خشکی چشم و دهان و لبخند کج دارند.

از بیمار خواستم چشم‌هایش را ببندد، مشکلی دیده نمی‌شد. در زمان صحبت لب بیمار کج می‌شد و معلوم بود بخشی از عصب صورتی در بیمار بهبود



دکتر آریستا شجاع‌الدین

لیزر تراپیست و مدرس لیزرهای پزشکی